

В Узбекистане обнаружен новый вид ириса

Ученые Института ботаники Академии наук Республики Узбекистан открыли новый вид растения - *Iris anvarbekii*, распространенный в южных Памиро-Алайских горах Центральной Азии.



Этот новый вид, принадлежащий к подроду **Scorpiris** рода **Iris**, был обнаружен в гипсовых горах

недалеко от села Шуроб в Сурхандарьинской области и отличается своими уникальными морфологическими особенностями.

Iris anvarbekii относится к клану *I. narbutii* и является близким видом к видам *I. narbutii*, *I. narynensis*, *I. rodionenkoi* и *I. rudolphii*. Однако он отличается от других видов отсутствием фиолетовых пятен на внешних лепестках (падениях), неразделенной шейкой (край), петалоидной формой внутренних лепестков (стандартов) длиной 3,0-3,5 см и фиолетовым цветом. Эти характеристики стали основанием для его классификации как уникального нового вида ириса.

Филогенетический анализ (на основе генов *matK* и *trnL-trnF*) показал, что *Iris anvarbekii* *I. subg.* Входит в подрод *Scorpiris*, но значительно отличается от *I. narbutii*.

Новый вид ириса назван в память об узбекском ботанике Анварбеке Джаббарове "Анварбек гулсафари."

В настоящее время идентифицирована только одна популяция этого нового вида ириса в Узбекистане, насчитывающая приблизительно 1000 особей растений, которые были предложены для включения в Красный список МСОП в категории "Недостаточно информации" (DD).

Результаты исследования опубликованы в журнале *Nordic Journal of Botany* (<https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/njb.04860>).